


Endoskopická adenotomie plasmakoblací – moderní odstranění nosní mandle pod endoskopickou kontrolou

Varianty výkonu nabízené na oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., doba hospitalizace: 2,5 dne



Tonsils and Throat

Plasmakoblace – odstranění nosní mandle pomocí speciální sondy vytvářející plasmové pole (kombinace radiofrekvence a koagulace), kdy dochází k odpařování tkáně nosní mandle při nízké teplotě. (60 °C) Jedná se o moderní metodu, kdy se snižuje riziko krvácení při operačním výkonu a operační pole je přehlednější. Je prokázáno snížení pooperační bolestivosti v porovnání s klasickými metodami adenotomie. Metoda je vhodná pro hůře dostupné oblasti nosohltanu, tím snižuje riziko dorůstání nosní mandle. Hojení probíhá bez nutnosti nasazení antibiotické léčby, kterou podáváme pouze v případě příznaků zánětu (zvýšená teplota)

Doplatek 10000 Kč

alternativy – pokud nemáte zájem o odstranění nosní mandle plasmakoblací, existují alternativy, které jsou v mnoha ohledech srovnatelné. O konkrétní metodě se rozhodne ošetřující lékař či operátor dle velikosti mandle, jejím plošném rozsahu (zasahování k ústí tubárních valů apod.) či věku dítěte. Jde především o tyto metody:

– odstranění nosní mandle pomocí shaveru - jemného oscilačního nože propojeného se sáním. Výhodou je přesnější odstranění tkáně nosní mandle z hůře dostupných míst nosohltanu, klesá riziko dorůstání nosní mandle. Stavění krvácení probíhá kompresí tampony.

Doplatek 2000 Kč

– odstranění nosní mandle pomocí kyrety (kovový nástroj tvaru zahnutého okénkového nože) pod endoskopickou kontrolou, stavění krvácení kompresí tampony